

„Prevencija, redovno testiranje i „slow kill“ tretman kod „Bolesti srčanog crva“ u svakodnevnoj praksi“
- okrugli sto Parazitološke sekcije Udruženja veterinara male prakse srbije

Cilj skupa bio je razmena iskustava veterinara praktičara koji rade u hiperendemskim oblastima radi uočavanja problema i unapređenja pristupa usmerenog ka što boljem sprovođenju preventivnih mera i tretmanu kardiopulmonalne dirofilarioze.

Na okruglom stolu doneti su sledeći zaključci:

- Još uvek je prisutno dosta kolega koji ne shvataju ozbiljnost situacije na terenu, što nameće potrebu za daljom kontinuiranom edukacijom veterinara; u tom smislu potrebno je redovno slati informacije o stručnim smernicama za Kardioplumnolanu dirofilariozu svim kolegama sa SASAP mailing liste i organizovati edukacije.
- Savet za testiranje i prevenciju kardiopulmonalne dirofilarioze mora da bude sastavni deo osnovnih zdravstvenih mera (vakcinacija, dehelmintizacija, savet za ektoantiparazitike i sl.) i sastavni deo preanestetičkog ispitivanja. Preporuka za redovno testiranje treba da bude saopštena kada vlasnik dolazi zbog osnovnih preventivnih mera i nije opterećen statusom bolesnog ljubimca. Prilikom predočavanja informacija o dirofilariozi moramo imati aktivan pristup i informacije specifično prilagoditi svakom klijentu.
- Informisanje vlasnika mora da obuhvati usmeno saopštenje ali i da se obavezno uruči pisani materijal, koji će poneti sa sobom (videti brošure pripremljene za štampu na sajtu SASAP). Veoma su korisni videobim, posteri i brošure u čekaonici. Ukoliko imaju mogućnosti, veterinari moraju da iskoriste lokalne medije (radio, televizija) u cilju edukacije vlasnika ljubimaca.
- Testiranje mora da obuhvati modifikovani Knottov test i antigen test. Potrebno je testirati sve pse koji imaju respiratorne ili kardiološke simptome. Rutinski test, kod asimptomatskih pasa, pre otpočinjanja preventivnih mera, raditi u aprilu mesecu.
- U cilju praćenja stanja na terenu mora se voditi evidencija o incidenci unutar svake prakse (imati poseban protokol o svih testiranim i pozitivno dijagnostikovanim pacijentima). Minimalni podaci koje svaka praksa treba da ima su: ukupan broj pozitivnih na godišnjem nivou i broj pozitivnih u odnosu na ukupan broj testiranih pasa.
- U okviru „slow kill“ tretmana, doksiciklin se aplikuje dva puta dnevno u (pojedinačno) dozi od 10 mg/kg, samo tokom prvih mesec dana. Preporuka učesnika je da se tokom „slow kill“ tretmana aplikacija ivermektina obavlja unutar veterinarske prakse, od strane obučene osobe. Nakon otpočinjanja terapije, prvi antigen test uraditi nakon šest meseci, a zatim psa testirati svakog meseca do dobijanja dva uzastopna negativna rezultata testa.

- Učesnici okruglog stola se slažu da je potrebno da svi veterinari koriste jedinstveni formulare preventivnih mera i načina sprovođenja „slow kill“ tretmana, koji su sastavni deo ovih zaključaka.

Prilog pripremio Nenad Milojković